

Praxbind (idarucizumab), OP/IVA Region Jönköpings län och Eksjö akutmottagning

ANTIDOT

För reversering av Pradaxa (dabigatran)

Komposition för sprutpump

Praxbind 50 mg/mL	2 x 50 mL (= 2,5 g/50 mL)
-------------------	---------------------------

Beredning

1. Dra upp Praxbind 2 x 2,5 g i två stycken 50 mL-sprutor.

Dosering

Hela dosen, 5 g (=100 mL), administreras intravenöst som infusion, under 10-20 minuter (= 300-600 mL/h).

Infarten spolas med Natriumklorid 9 mg/mL, före och efter infusion.

Observera

Används vid livshotande situation. Högre doser kan krävas vid stora överdoser av Pradaxa (dabigatran).

Ring Giftinformationscentralen för diskussion (010-456 67 19).

Praxbind får inte samadministreras med andra läkemedel. Ingen annan infusion ska administreras parallellt via samma intravenösa infart.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i originalförpackningen i **kylskåp**. Ljuskänsligt.

Öppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i upp till 48 timmar.

Skall användas omedelbart efter öppnande.

Lagerhållning: För senaste information om lagerhållning se SVEPA.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT