

## Åtgärdschecklista vid covid-19 i särskilt boende enligt SoL och LSS eller korttidsenhet

*Till dig som chef*

Förutom checklistan rekommenderas genomgång av:

- [Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 på korttidsenhet och särskilt boende](#)
- [Utökad provtagning \(screening\) för covid-19 vid utskrivning från sjukhusvård, vid in- och överflyttning inom kommunal vård och omsorg](#)
- [Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare på särskilt boende enligt SoL och LSS eller korttidsenhet](#)

### Vid misstänkt fall med symtom på covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Hänvisa vårdtagare till att vistas i egen lägenhet/rum med egen toalett och dusch.	
Tillämpa skärpta hygienrutiner.	
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.	
Kontakta sjuksköterska för bedömning som i sin tur kontaktar läkare efter behov för medicinsk bedömning och ställningstagande till provtagning.	
Avdela <i>om möjligt</i> särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med symtom dag och natt.	
Uppmuntra till extra vaksamhet på symtom hos övriga vårdtagare.	
<b>Vid negativt provsvar hos vårdtagare med symtom på covid-19</b>	
Vårdtagare ges omsorg utifrån en medicinsk bedömning. Tillämpa adekvata vårdhygieniska åtgärder utifrån symtombilden.	

### Vid konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Vidta <a href="#">begränsande åtgärder</a> redan vid ett fall på enheten. Samtliga vårdtagare på enheten hänvisas till att vistas så mycket som <i>möjligt</i> i egen lägenhet/rum.	
Tillämpa skärpta hygienrutiner.	
Säkerställ tillgång till och användning av adekvat skyddsutrustning samt att avklädning av skyddsutrustning sker på ett säkert sätt.	
Se till att alla vårdtagare uppmanas till och eventuellt får hjälp med att tvätta händerna ofta och noga.	

Avdela <i>om möjligt</i> särskild omvårdnadspersonal för vård- och omsorg till vårdtagare med konstaterad smitta dag och natt.	
Se till att daglig symtomkontroll utförs på övriga vårdtagare på enheten. Använd <a href="#">checklista för symtomkontroll vårdtagare</a>	
Informera vårdtagare på enheten om att <a href="#">begränsande åtgärder</a> vidtas på grund av konstaterad covid-19. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat.	
Informera närstående om att <a href="#">begränsande åtgärder</a> vidtas på grund av konstaterad covid-19. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat.	
Säkerställ att daglig städning sker hos vårdtagare samt i gemensamma utrymmen och personalutrymmen.	
Inflyttning av ny vårdtagare till enheten, korttidsplats eller växelvård <i>bör</i> inte ske när smitta finns på enheten.	
Vårdtagare med covid-19 smittfriförklaras av sjuksköterska i samråd med läkare. <a href="#">Vägledning för smittfriförklaring</a>	
Tillämpa <a href="#">begränsande åtgärder</a> på enheten tills 14 dagar gått från sista exponeringstillfället. Efter smittfriförklaring av bekräftat fall kan restriktioner hävas för den enskilde vårdtagaren.	
<b>Smittspårning vid nyupptäckt fall hos vårdtagare med covid-19</b>	
Kartlägg och upprätta <a href="#">kontaktlista för smittspårning</a> på alla vårdtagare på enheten, samt personal och andra personer som har varit i kontakt med smittad vårdtagare. Detta oberoende om skyddsutrustning används eller inte.	
Informera vårdtagare på enheten, personal och andra personer att de kan ha blivit utsatt för smitta och att de ska vara observanta på symtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat. Överlämna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informationsblad till vårdtagare/brukare</a></li> <li>• <a href="#">Information till personal</a></li> <li>• <a href="#">Informationsblad till närkontakter</a></li> </ul>	
Överlämna kontaktlista för smittspårning till ansvarig vårdcentral för ordination. Efterhör när provtagningsunderlag (ordination) finns tillgängligt.	
Se till att provtagning utförs av vårdtagare på boendet.	
Hänvisa personal till sin vårdcentral för provtagning mån-fredag. Överlämna skriftlig <a href="#">Information till personal som provtas för covid-19 i samband med smittspårning i kommunal vård och omsorg</a>	
<b>Vid negativt provsvar i samband med smittspårning vid nyupptäckt fall</b>	
Se till att daglig symtomkontroll utförs på vårdtagare. Använd <a href="#">checklista för symtomkontroll vårdtagare</a>	
Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare efter 3-6 dagar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.	
Provtagning upprepas på personal <u>endast</u> om symtom tillkommer. Personal kontaktar då sin vårdcentral. Be personal återkoppla till dig om provsvar.	
<b>Vid positivt provsvar i samband med smittspårning vid nyupptäckt fall</b>	

Följ <a href="#">Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 på korttidsenhet och särskilt boende.</a>	
Ny smittspårning startar av nytt positivt fall. Kartlägg och upprätta ny kontaktlista för smittspårning på vårdtagare, personal och andra kontakter som varit i kontakt med smittad vårdtagare.	
Informera eventuellt nya vårdtagare på enheten och andra nya personer att de kan ha blivit utsatt för smitta och att de ska vara observanta på symtom under 14 dagar från sista möjliga smittotillfället. Sekretess råder kring vilken person som insjuknat. Överlämna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informationsblad till vårdtagare/brukare</a></li> <li>• <a href="#">Information till personal</a></li> <li>• <a href="#">Informationsblad till närkontakter</a></li> </ul>	
Provtagning <u>enbart</u> på personer med symtom.	
<b>Sammanställning av smittspårning kring första nyupptäckta fallet</b>	
Sammanställ en <a href="#">slutrapport</a> efter smittspårning. Görs då kartläggning är gjord, kontakterna listade och informerade samt provtagning nr 1 och nr 2 är utförd och svar finns. Skicka en kopia av sammanställningen till Medicinskt ansvarig sjuksköterska och till Smittskydd Vårdhygien.	

Vid inflyttning från ordinärt boende, efter sjukhusvård samt efter mottagningsbesök

<b>Särskilda boendeformer och korttidsplats</b>	
Säkerställ <i>om möjligt</i> om det finns information om det funnits fall av covid-19 på den enhet som vårdtagaren flyttar ifrån och om vårdtagaren kan vara exponerad och i så fall på vilket sätt. Exempelvis bor eller har bott tillsammans med person som har covid-19.	
Provtagning (screening) för covid-19 utförs på vårdtagaren <i>helst</i> så att svar föreligger vid inflyttning/överflyttning. Undantag från provtagning är de som har eller haft en bekräftad covid-19 infektion inom 6 mån, kortare mottagningsbesök eller dialys där transport till och från enheten sker under ordnade former. Prov ska inte vara äldre än 2 dygn vid utskrivning från sjukhus. Övrig screening utförs mån-fredag.	
Vårdtagare utan symtom, som <b><i>inte utsatts konstaterad smitta</i></b> ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid avsaknad av aktuellt provsvar hänvisas vårdtagaren att vistas i eget rum/lägenhet i väntan på provsvar.</li> <li>• Vid negativt provsvar kan vårdtagaren vistas och röra sig på enheten.</li> </ul>	
Vårdtagare utan symtom, som <b><i>utsatts för konstaterad smitta</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ska om möjligt vistas i sitt rum/lägenhet tills 14 dagar gått från senast möjliga kontakt med smittsam person. Detta oavsett provsvar.</li> <li>• ska observeras och bedömas med fokus på infektionssymtom dagligen under 14 dagar från senast möjliga kontakt med smittsam person. <a href="#">Använd</a></li> </ul>	

<p><a href="#">checklista för symtomkontroll vårdtagare</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårdtagare utan symtom, bedömd som <b>närkontakt</b> ses inte som smittsam, men löper risk att insjukna. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.</li> <li>• Vårdtagare utan symtom, bedömd som <b>hushållskontakt</b> löper stor risk att insjukna med symtom och ses som ett misstänkt fall det vill säga smittsam i 7 dagar efter att det bekräftade fallet provtogs. Ge vård och omsorg med fokus på <i>skärpta hygienrutiner</i> med särskild skyddsutrustning (munskydd och visir) under de första 7 dagarna. Därefter tillämpas vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.</li> </ul>	
<p>Positivt provsvar hanteras enligt <a href="#">Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid 19 på korttidsenhet och särskilt boende</a>. Önskvärt är att vårdtagaren skrivs ut till särskild covid-enhet om det finns i kommunen.</p>	
<p>Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare med negativt provsvar efter 3-6 dagar. Ytterligare provtagning kan bli aktuellt om symtom uppstår under inkubationstiden på 14 dagar.</p>	
<p><b>Beviljad växelvård</b></p>	
<p>Se till att provtagning utförs inför första växelvårdstillfället. Upprätta därefter en individuell plan för bedömning och provtagning utifrån ex mängden olika sociala kontakter som vårdtagaren har. Planen upprättas tillsammans med den som har hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	
<p>Efter provtagning vidtas åtgärder utifrån se rubrik särskilda boendeformer och korttidsplats.</p>	
<p>Säkerställ att provtagning upprepas på vårdtagare med negativt provsvar efter 3-6 dagar.</p>	
<p>Se till att symtomkontroll utförs <i>inför</i> varje växelvårdstillfälle. Använd <a href="#">checklista för symtomkontroll vårdtagare</a></p>	
<p>Vårdtagare som inte provtagits (ska inte ha symtom och inte utsatts för konstaterad smitta), vistas och rör sig fritt på enheten, förutsatt att vårdtagaren undviker nära kontakter. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.</p>	
<p><b>Efter mottagningsbesök inom sjukvården</b></p>	
<p>Vårdtagaren kan vistas och röra sig fritt på enheten, förutsatt att vårdtagaren undviker nära kontakter. Ges vård och omsorg enligt vanliga hygienrutiner, det vill säga utan särskild skyddsutrustning.</p>	