

Readi-Cat 2

Vad är Readi-Cat 2?

Readi-Cat 2 innehåller bariumsulfat som är ett röntgenkontrastmedel. Detta används för att diagnostisera eller hitta problem i matstrupe, magsäck och tarm. Kontrastmedlet ”färgar” kvarvarande innehåll för att kunna skilja det från eventuella förändringar i vägg och slemhinna.

För dig med känd överkänslighet, var god se under Övrigt innehåll.

Hur ska jag ta läkemedlet?

Två dagar före undersökningsdagen ska du börja dricka kontrast. Denna dag får du äta och dricka som vanligt.

- Till lunchen - Tag 1 dl av Readi-Cat 2 (skaka flaskan innan).
- Till kvällsmaten - Tag 2 dl av Readi-Cat 2 (skaka flaskan innan).

Dagen före undersökningsdagen får du förutom Readi-Cat 2 endast dricka klara drycker (se instruktioner för laxering med Picoprep).

- Kl. 07 - Picoprep enligt separat instruktion.
- Kl. 09 - Tag 2 dl av Readi-Cat 2 (skaka flaskan innan).
- Kl. 13 - Tag 2 dl av Readi-Cat 2 (skaka flaskan innan).
- Kl. 17 - Tag 2 dl av Readi-Cat 2 (skaka flaskan innan).
- Kl. 18 – Picoprep enligt separat instruktion.

Övrigt innehåll

Readi-Cat 2 innehåller hjälpämnen: bensoesyra, citronsyra, kaliumsorbat, sackarinatrium, simetikonemulsion, natriumbensoat, natriumcitrat, sorbitollösning, xantangummi och renat vatten. Dessutom förekommer naturliga och artificiella smakämnen som bl a banan, blåbär, apelsin, vanilj, choklad och kaffe (se smak på respektive förpackning).

Mer information

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Läs mer på fass.se eller 1177.se. Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.