

Mepivakain (Carbocain)-adrenalin, ropivakain, ketorolak (Toradol), OP Jönköping

Komposition

Mepivakain (Carbocain)-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL	20 mL
--	-------

Ropivakain (Narop) 7,5 mg/mL	15 mL
Ketorolak (Toradol) 30 mg/mL	1 mL

Ropivakain (Narop) 7,5 mg/mL	20 mL
------------------------------	-------

Beredning

1. Dra upp 20 mL Mepivakain (Carbocain)-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL i en 20 mL-spruta.
2. Dra upp 15 mL Ropivakain 7,5 mg/mL och 1 mL Ketorolak 30 mg/mL i en 20 mL-spruta.
3. Dra upp 20 mL Ropivakain 7,5 mg/mL i en 20 mL-spruta.

Dosering

Infiltrationsanestesi ges i hud 20 mL Mepivakain (Carbocain)-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL med en grön spets.

Intraartikulärt ges 15 mL Ropivakain 7,5 mg/mL och 1 mL Ketorolak 30 mg/mL med grön spets eller via artroskopet.

Mot Hamstringsmuskulaturen ges 20 mL Ropivacain 7,5 mg/mL med en grön spets.

Observera

Ges vid korsbandsoperation Hamstring.

Hållbarhet och förvaring

Carbocain-adrenalin förvaras i kylskåp i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Ketorolak förvaras i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT