

Cisplatin

Vad är cisplatin?

Cisplatin tillhör gruppen läkemedel som kallas cytostatika. Det används bl.a. för att behandla lungcancer men även för testikel-, äggstocks- och urinblåsecancer, ofta i kombination med andra läkemedel. Cisplatin verkar genom att hindra tillväxten av cancerceller.

Hur tar man medicinen?

Cisplatin ges av sjukvårdspersonal med särskild kunskap att hantera cytostatika. Cisplatin ges som infusion (dropp) direkt i blodet under 60 minuter. Läkaren anpassar dosen efter din ålder, kroppsstorlek och allmänna medicinska tillstånd. Dosen beror också på vilken annan behandling du får. Vanligtvis får man infusionen var 3:e vecka. Alternativt vecka 1+2 och ledigt vecka 3.

Drick mer än du brukar den dag du fått cisplatin dropp och de 2-3 följande dagarna.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Inför din behandling med cisplatin får du tabletter som förebygger illamående.

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Några vanliga biverkningar av cisplatin är diarré, illamående och kräkningar, påverkan på blodets sammansättning, lindrigt håravfall och påverkan på hörseln. Du kan känna

känsla av domningar/ stickningar i huden.

Andra symtom kan vara smärta i händer eller fötter eller försämrad finmotorik, exempelvis svårigheter att knäppa knappar eller svårt att gå.

Du får läkemedel som förebygger illamående inför din behandling.

Vid misstanke om biverkningar bör du kontakta din kontaktsjuksköterska. Om du drabbas av knipsmärter i buken, diarréer, svettningar eller ett ökat tårflöde inom 24 timmar efter infusionen skall du inte dröja med att kontakta sjukvården. Hjälp finns för att snabbt häva dessa akuta biverkningar.

Om du drabbas av diarré mer än 24 timmar efter att du fått infusionen ska du använda medicin som stoppar diarré, t ex tablett loperamid, enligt särskild instruktion. Om effekten av loperamid uteblir och du har fler än 3-4 extra avföringar per dygn (utöver det vanliga) eller om du har mycket tunnflytande och riklig avföring/diarré, skall du kontakta sjukvården.

Det är viktigt att du också rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom cisplatin kan påverka ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.