

Fentolamin (Regitine, Regitin, Phentolamine) 1 mg/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

ANTIDOT - Kan användas vid överdosering av adrenergika

OBS! Ges i samråd med Giftinformationscentralen (GIC).

Kortverkande alfa-adrenoceptorantagonist

Komposition för SPRUTPUMP

Fentolamin 10 mg/mL	5 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	45 mL

Beredning

1. Dra upp 45 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump.
2. Tillsätt 5 mL Fentolamin 10 mg/mL.
3. Blanda noga. Koncentrationen Fentolamin i beredningen blir 1 mg/mL.

Komposition för INJEKTION

Fentolamin 10 mg/mL	1 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	9 mL

Beredning

1. Dra upp 9 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 10 mL-spruta.
2. Tillsätt 1 mL Fentolamin 10 mg/mL.
3. Blanda noga. Koncentrationen Fentolamin i beredningen blir 1 mg/mL.

Dosering

Dosering i samråd med GIC.

Kan ges intravenös och intraarteriellt.

Observera

Licenspreparat

Hållbarhet och förvaring

Förpackning kylförvaras.

Hållbar i rumstemperatur 12 timmar efter beredning.

Lagerhållning, se SVEPA.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT