Furosemid
(Furix, Furosemid, Impugan)

Vad är furosemid?
Furosemid är kraftigt vätskedrivande läkemedel som används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel vid hjärtsvikt. Det gör att man kissar mer än vanligt och på så sätt blir av med vätskeöverskottet. Det avlastar hjärtat. Läkemedlen kan även användas mot högt blodtryck.

Hur tar man medicinen?
Du bör ta tabletterna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Furosemid börjar verka efter cirka en halvtimme och effekten varar i upp till sex timmar. Du kan själv kontrollera om medicinen har bra effekt på dig genom att väga dig minst 1 gång i veckan. Tänk på att alltid väga dig vid samma tid på dygnet och använda samma våg varje gång. Kontakta din läkare om du går upp mer än 2 kg i vikt eller får svullna ben. Detta kan vara ett tecken på att medicinen inte har tillräckligt bra effekt.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Viktigt
Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Men försök att inte ta den senare än klockan tre på eftermiddagen. Om du tar tabletten senare är det risk att nattsömnen blir störd. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra. Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt
Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar
Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder Furosemid kan få brist på salter i blodet. För att kontrollera salterna i blodet tar man blodprover. En annan biverkan är muntorrhet, om du blir väldigt torr i munnen är det extra viktigt att du är noggrann med munhygienen. Du kan lindra muntorrhet och törst genom att använda tabletter eller spray som ökar mängden saliv. Dessa finns att köpa på apotek.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt
Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.