

Morfin (Dolcontin, Morfin)

Vad är Dolcontin/Morfin?

Dolcontin/Morfin används vid långvarig och svår smärta. Dolcontin/Morfin verkar kraftigt smärtstillande genom att blockera smärtsignaler till hjärnan.

Hur tar jag Dolcontin/Morfin?

Ta tabletterna tillsammans med vätska. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare.

Morfin är snabbverkande och kan tas vid behov eller regelbundet. **Dolcontin** är en långverkande tablett som tas regelbundet och måste sväljas hela. Om du ska ta Dolcontin/Morfin regelbundet ska de tas vid samma tider varje dag. Välj tider som passar ihop med dina dagliga rutiner.

Om du fått Dolcontin/Morfin mot tillfällig smärta, till exempel efter en operation, ska du minska dosen när smärtan minskar. Om du har fått läkemedel med paracetamol, ex Alvedon eller Panodil, tillsammans med Dolcontin/Morfin bör du minska dosen Dolcontin/Morfin innan du minskar dosen paracetamol. Utsättningsbesvär kan förekomma om behandlingen avslutas tvärt. Vid behandling i mer än en vecka ska dosen minskas i samråd med din läkare.

Om du glömt att ta Dolcontin/Morfin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa dos ska du inte ta någon extra.

Om man tar Dolcontin/Morfin tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem och medvetandesänkning. Kombinera därför inte medicinen med alkohol utan att rådgöra med din läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Läkemedel har i första hand positiva effekter men ibland kan de ge biverkningar.

Dolcontin/Morfin kan ge trötthet, illamående eller kräkningar. Dessa biverkningar är vanligast i början av behandlingen och försvinner oftast vid fortsatt användning. Det är du själv som kan bedöma om du är tillräckligt alert för bilkörning.

Dolcontin/Morfin kan orsaka förstoppning. Detta kan förebyggas med t ex katrinplommon eller hela linfrön tillsammans med rikligt vätskeintag. Läkemedel som förebygger förstoppning är t ex Laktulos eller Laxiriva. Vid svårare förstoppning kan man även använda t.ex. Cilaxoral. Muntorrhet är vanligt, vilket ökar risken för hål i tänderna. Detta kan förebyggas med fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.