

Alteplas (Actilyse) - schema för behandling av central venkateter okluderad av koagel, Onkologkliniken, Ryhov

Komposition

Alteplas 2 mg	1 injektionsflaska
Sterilt vatten	2,2 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	4 mL

Beredning

1. Ta fram Alteplas 2 mg ur kylskåpet.
2. Tillsätt 2,2 mL sterilt vatten till ampullen. Blanda försiktigt, risk för skumbildning. Koncentrationen på Alteplas blir 1 mg/mL.
3. Späd 1 mL Alteplas 1mg/mL med 4 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Koncentrationen blir då 0,2 mg/mL.
4. Injicera Alteplas 0,2 mg/mL i CVK/CDK/venport motsvarande katetervolym (oftast mellan 1-5 mL).
5. Vänta i 30 minuter.
6. Försök aspirera ur katetern, går inte detta spola med koksalt.
7. Om du har lyckats öppna katetern är det viktigt att spola genom systemet med 40-60 mL koksalt.
8. Om du inte har lyckats återställa kateterns funktion upprepa punkt 1-4. och låt Alteplas 0,2 mg/mL-blandningen vila i katetern i upp till 1 dygn (diskutera gärna med narkosläkare).

Observera

Ljuskänslig. Förvaras i kylskåp.

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning av stamlösning: I rumstemperatur 8 timmar. I kylskåp 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT