

Amiodaron 15 mg/mL (Cordarone) Region Jönköpings län – gäller vid A-HLR-situation för VUXNA

Komposition för injektion (dos 1)

Amiodaron 50 mg/mL	6 mL (300 mg)
Glukos 50 mg/mL	14 mL

Beredning

1. Dra upp 14 mL Glukos 50 mg/mL i en 20 mL spruta.
2. Dra upp 6 mL Amiodaron 50 mg/mL i en 10 mL spruta.
3. Tillsätt Amiodaron 50 mg/mL till 20 mL sprutan med glukos.
4. Blanda försiktigt eftersom det finns risk för skumbildning. Koncentrationen Amiodaron blir 15 mg/mL.
5. Ge som snabb intravenös injektion.

Komposition för injektion (dos 2)

Amiodaron 50 mg/mL	3 mL (150 mg)
Glukos 50 mg/mL	7 mL

Beredning

1. Dra upp 7 mL Glukos 50 mg/mL i en 10 mL spruta.
2. Dra upp 3 mL Amiodaron 50 mg/mL i en 5 mL spruta.
3. Tillsätt Amiodaron 50 mg/mL till 10 mL sprutan med glukos.
4. Blanda försiktigt eftersom det finns risk för skumbildning. Koncentrationen Amiodaron blir 15 mg/mL.
5. Ge som snabb intravenös injektion.

Dosering

Enligt HLR-algoritm:

Dos 1: 300 mg (=20 ml)

Dos 2: 150 mg (=10 ml)

Observera

Endast i samband med Avancerad hjärt-lungräddning på VUXNA.

Får ej spädas med Natriumklorid 9 mg/mL eftersom fällning kan uppstå.

Läkemedlet är kraftigt kärlretande så spola efter.

Hållbarhet och förvaring

Används omedelbart efter beredning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT