

Dihydralazin (Nepresol) Bolus 5 mg/mL kvinnoklinikerna, Region Jönköpings län

Komposition för intermittent bolusinjektion

Dihydralazin 25 mg (pulver)	1 st
Bifogad spädningsvätska (sterilt vatten)	2 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	3 mL

Beredning

1. Tillsätt 2 mL bifogad spädningsvätska till pulver Dihydralazin. Blanda.
2. Koncentrationen Dihydralazin i stamlösningen blir 12,5 mg/mL.
3. Dra upp 3 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 5 mL-spruta och dra upp stamlösningen i samma spruta. Blanda nogga. Koncentrationen Dihydralazin i beredningen blir 5 mg/mL.

Doserin

Ge 1 mL långsamt intravenöst och avvakta effekten. Om ingen effekt efter 20 minuter, ge ytterligare 1 mL. Kan upprepas igen. Maxdos som injektion är 25 mg.

Observera

Licensläkemedel

Hållbarhet och förvaring

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Hållbarhet efter beredning: 24 timmar i rumstemperatur.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, barnmorskor/sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län (MW, SA, AH)