

## Mepivakain (Carbocain)-adrenalin + Natriumbikarbonat, Ortopedmottagningen och Akutmottagningen Jönköping

### Komposition

Carbocain-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL	15 mL (ur en 20 mL injektionsflaska)
Natriumbikarbonat 50 mg/mL	5 mL (ur en 100 mL flaska)

### Beredning

1. Dra upp 5 mL Carbocain-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL med en 5 mL-spruta och KASSERA. Kvar finns 15 mL i flaskan.
2. Dra upp 5 mL Natriumbikarbonat 50 mg/mL med en rosa kanyl i en 5 mL-spruta och tillsätt till flaskan med 15 mL Carbocain-adrenalin 10 mg/mL + 5 mikrogram/mL. Blanda.
3. Koncentrationen carbocain i blandningen blir 7,5 mg/mL och av adrenalin cirka 4 mikrogram/mL.
4. Dra upp 10 mL av den buffrade blandningen i en steril 10 mL spruta med ny rosa kanyl och sätt på tilltänkta kanylen som operatören ska spruta med, oftast blå kanyl.

### Dosering

Infiltrationsanestesi ges i hud av operatören med valfri kanyl (oftast blå kanyl) för att minska patientens obehag vid bedövning i operationsområdet.

Visa upp de ordinerande läkemedlen för operatören.

### Observera

Ges vid polikliniska operationer på ortopedmottagningen såsom bland annat karpaltunnel- och senkideklyvningar av fingrar och exstirpation av hudförändringar.

Generellt ska inte läkemedel innehållandes adrenalin ges vid lokalbedövning av utstående kroppsdelar såsom fingrar och tår utan ska endast ges enligt speciell läkarordination, så även denna blandning.

### Hållbarhet och förvaring

Carbocain-adrenalin förvaras i kylskåp i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Beredningen görs omedelbart före administrering.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**