

Propylenglykol (Locobase LPL, Oviderm, Propyderm, Propyless)

Vad är propylenglykol?

Propylenglykol är det verksamma ämnet i läkemedlet och binder vatten i huden så att torr hud blir mer normal. Den har även viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier.

Locobase LPL finns som kräm och innehåller 20 procent propylenglykol och 4,5 procent mjölksyra. Mjölksyra är avfjällande.

Oviderm finns som kräm och innehåller 25 procent propylenglykol och 20 procent fett.

Propyderm innehåller även fett, som gör huden mjuk och smidig. Propyderm finns som kräm och innehåller 20 procent propylenglykol och 24 procent fett.

Propyless finns som kutan emulsion och innehåller 20 procent propylenglykol och 9 procent fett. Kutan betyder att den ska användas på huden.

Hur tar man medicinen?

Smörj in krämen/emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk, men inte kladdig. Smörj gärna flera gånger om dagen.

Man ska alltid smörja in huden när man varit i kontakt med vatten. Om man har duschat eller badat bör man smörja på krämen inom några minuter, då det fortfarande finns fuktighet kvar i huden.

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda

medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller i bipacksedeln.

Viktigt

Du ska inte använda den på brännskadad hud. Du ska inte heller använda den i hörselgången.

Om man tar andra krämer samtidigt

Mjukgörande krämer ska inte smörjas på samtidigt som till exempel kortisonläkemedel, eftersom kortisonet då kan spädas ut. Det är bra att vänta ungefär en timme efter att man har smörjt in kortisonläkemedlet.

Graviditet och Amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

För att barnet inte ska få i sig propylenglykol i onödan bör du inte använda den på bröstvårtorna när du ammar.

Biverkningar

Hos en del personer som använder medicinen kan det till exempel svida och klia på huden. Huden kan också rodna och man kan känna stickningar, särskilt i början av behandlingen. Besvären går oftast över när man har använt krämen en tid.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.