

Lymfom Cytarabine (Ara-C) högdos - CNS-profylax

Kurintervall: 14 dagar. Vanligen ges 1-2 kurer.

Indikation: Profylax mot CNS-recidiv av aggressiva lymfom.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Cytarabine (ARA-C)	3000*	2 (intervallet skall vara 12 timmar)	4	i.v.	1,2
B	Filgrastim (eller PEG-filgrastim)	Standarddos med avseende på pat vikt	1	8 (1 om PEG-filgrastim ges)	s.c	4-11 (om PEG-filgrastim= dag 4)

* Lägre doser till äldre. Se kunskapsbanken på RCC.

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Dag 12-14 behandlingsuppehåll	Dag 15ny cykel/kur
A	Cytarabine	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Filgrastim	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	-	

- Profylax mot konjunktivit: Ögondroppar Prednisolon APL ögondroppar 5 mg/ml (0,5 %) 2 droppar 4 gånger dagligen i vardera ögat i 4 dagar med start behandlingens första dag (dag 1)
- Medelemetogen. För detaljer se Cytodose/ELAS. Lägg till T. olanzapin 2,5 mg-5 mg (max 10 mg/dygn)
- Överväg profylax pneumocystis jiroveci, samt mot virus- svampinfektion
- Patienten skall uppmanas att dricka rikligt. Administrering i perifer nål endast i undantagsfall
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- [Cytarabin högdos-CNS profylax kunskapsbanken RCC](#)

Substans	Neutrofila	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK	TPK
	≥0,5	0,5-0,2	≤ 0,2	≥ 75	74-51	≤ 50
Cytarabine	100%	75 %	Paus	100%	75 %	Paus

Patientinformation

- [Patientinformation från kunskapsbanken RCC](#)
- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Länssjukhuset Ryhov akut?](#)
- [Infektion, råd riktade till särskilt infektiöskänsliga](#)

Körschema Cytarabine (Ara-C) högdos

Dag	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	1 Sätt spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml kopplat till Cyto Ad set, för spolning före och efter respektive läkemedel.		
	2 Ge antiemetika		cytodose
	3 Ge Cytarabine (Ara-C) spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion under 1 timme	1 timme	cytodose
	4 Paus (viktigt att hålla 12 timmars intervall mellan start av doserna)	11 timmar	
	5 Sätt spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml kopplat till Cyto Ad set, för spolning före och efter Cytarabine		
	6 Ge Cytarabine (Ara-C) spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion under 1 timme	1 timme	cytodose
	Paus (11 timmar skall passera innan behandling startas dag 2)	11 timmar	
2	1 Sätt spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml kopplat till Cyto Ad set, för spolning före och efter respektive läkemedel.		
	2 Ge antiemetika		cytodose
	3 Ge Cytarabine (Ara-C) spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion under 1 timme	1 timme	cytodose
	4 Paus (viktigt att hålla 12 timmars intervall mellan start av doserna)	11 timmar	
	5 Sätt spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml kopplat till Cyto Ad set, för spolning före och efter Cytarabine		
	6 Ge Cytarabine (Ara-C) spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion under 1 timme	1 timme	cytodose
3	Ingen behandling	-	-
4	Starta s.c inj Filgrastim dag 4		cosmic