

Lymfom Cyklofosfamid/Fludarabin

Kurintervall 28 dagar

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Cyklofosfamid (Sendoxan)	250	1	3	p.o	1-3
B	Fludarabin (Fludara)	40 mg	1	3	p.o	1-3

	Substans/dag	1	2	3	Dag 4-28 behandlingsuppehåll	Dag 29 ny cykel/kur
A	Cyklofosfamid	A	A	A		
B	Fludarabin	B	B	B		

Övrigt

- Antiemetika - individualisera
- Pneumocystisprofylax övervägs
- Ge bestrålade blodprodukter vid eventuellt transfusionsbehov (under, och 6 månader efter Fludarabehandling)
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 0,5	<75
A+B	Paus	Paus

Patientinformation

- Ta tabletterna på morgonen 30 minuter före måltid. Måste sväljas hela.
- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Länssjukhuset Ryhov akut?](#)

Körschema Cyklofosfamid/Fludarabin lymfom dag 1-3

	Att göra	Var ordinerat
1	Ge antiemetika	cosmic
2	Ge tablett Sendoxan	cosmic
3	Ge tablett Fludara	cosmic