

Myelom MP- V (Melfalan, Prednison - Bortezomib)

Kurintervall: 5 veckor

Cytodose: Nej

Indikation

Multipelt myelom samt amyloidos

	Substans (preparat)	Dos/administrerings tillfälle	Antal administreringstillfällen/dygn	Antal doser per kur	Dag	
A	Melfalan* (Alkeran)	0,18 mg/kg	1	4	p.o.	1-4
B	Prednisolon	2 mg/kg (ofta ges fast dos, 100 mg)	1	4	p.o.	1-4
C	Bortezomib	1,3 mg/m ²	1	4	s.c	1,8,15,22

* Melfalan bör tas på fastande mage, 30 minuter före frukost

Övrigt

- Överväg allopurinol vid hög tumörbörda (M-komponent) och/eller nedsatt njurfunktion.
- Antiemetika vanligen **ej** nödvändigt.
- **Dosreduktion** vid nedsatt njurfunktion (A+B), neutropen infektion vid tidigare cykel (A) eller uttalade biverkningar (B). Vid dåligt återhämtade värden inför behandling bör i första hand behandlingen skjutas upp (~1 vecka). Vid GFR<30 ml/min (och för äldre/sköra patienter) bör Melfalan vid första kuren reduceras till 75 % av normaldos. Reducera i första hand antalet behandlingsdagar.
- Vid platåfas (dvs. ingen ytterligare reduktion av M-komponent), avslutas behandlingen
- Alkeran förvaras i kylskåp
- Överväg profylax mot virusinfektion samt pneumocystis jirovecii
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- [MP-V kunskapsbanken RCC](#).

Patientinformation

- [Patientinformation från kunskapsbanken RCC](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken Eksjö akut?](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken Ryhov akut?](#)
- [Akut - när söka hematologiska sektionen medicinkliniken Värnamo akut](#)

Körschema MP-V

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patienten om respektive läkemedel (Prednisolon/Alkeran, samt Bortezomib). Recept, biverkningar, provtagning och uppföljning. Alkeranet förvaras i kylskåp och ska tas på fastande mage, t.ex. 30 minuter före frukost.	Cytodose samt recept via Cosmic
2.	Säkerställ att patienten vet att inte alla apotek har läkemedlen i lager. Oftast går det att få tillgång till läkemedlen inom 2 dygn efter att patienten har kontaktat sitt lokala apotek. Be patienten att om möjligt använda expeditiionsapoteket på sjukhuset.	
3	Ge tablett Ondansetron 8 mg peroralt eller säkerställ att de har tagit det hemma inför Bortezomib (kan vid behov även ges dag 2-4 - d.v.s. de dagar Alkeranet ges).	Cytodose samt recept via Cosmic
4	Ge ordinerad mängd Bortezomib subcutant	Cytodose