

Adrenalin 0,1 mg/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län, Gäller BARN vid A-HLR

Komposition

Adrenalin 0,1 mg/mL

förfylld spruta 10 mL

Beredning

Dos upp till 2 mL dras i separat spruta, annars använd förfylld spruta direkt.

1. Dra upp angiven volym enligt doseringstabell ur den förfyllda sprutan (eller ge direkt ur sprutan enligt tabell nedan).
2. Ge som en snabb intravenös injektion enligt tabell nedan.

Dosering

0,01 mg/kg vilket motsvarar 0,1 mL/kg. Se tabell.

Vikt (kg)	3	5	10	20	30	40	50	
Ålder (ungefärlig)	nyfödd	3 mån	1 år	5 år	9 år	12 år	14 år	Vuxendos
Adrenalin 0,1 mg/mL	0,3 mL	0,5 mL	1 mL	2 mL	3 mL	4 mL	5 mL	10 mL

Observera

Endast i samband med Avancerad hjärt-lungräddning på barn.

Spola infarten med natriumklorid 9 mg/mL efter given injektion.

Då ingen perifer eller central venkateter finns att tillgå kan läkemedlet administreras intraosseöst. Spola infarten med natriumklorid 9 mg/mL efter given injektion.

Hållbarhet och förvaring

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används omedelbart efter beredning.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT.