

Everolimus (Afinitor, Everolimus, Votubia)

Vad är everolimus?

Everolimus är ett antitumoralt läkemedel som används t.ex. för behandling av neuroendokrina tumörer med ursprung från bukspottkörtel, metastaserande bröstcancer och vid njurcellscancer. Det verksamma ämnet i medicinen kan bromsa tillväxten och spridningen av cancer.

Du har fått det för: _____

Hur tar man medicinen?

Du bör ta tabletterna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Vid behandling med everolimus rekommenderas du att undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas. Det är även viktigt att du förvarar tabletterna i originalförpackningen, eftersom tabletterna är ljus- och fukt känsliga.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Vissa personer behöver högre dos för att ha nytta av läkemedlet än andra. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta behandlingen. Den ska alltid avslutas i samråd med din läkare.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske. Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. En del som använder everolimus kan uppleva hosta, illamående, kräkning, diarré, sjukdomskänsla, infektioner, inflammation i munnen, nedsatt aptit, förändrat smaksinne, trötthet, huvudvärk, utslag, klåda, näsblod, perifert ödem, blodbrist, förhöjt kolesterol, få högt blodtryck och nagelbesvär. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Det är viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom everolimus kan sätta ner ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.