

Empagliflozin (Jardiance)

Finns även i kombination med diabetesläkemedlet Metformin eller Linagliptin (Synjardy/Glyxambi)

Vad är Jardiance?

Jardiance är ett läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom. Jardiance verkar genom att öka utsöndring av socker och salter i urinen. Vid en ökad utsöndring av salter ökar dessutom urinvolymen något. Resultatet av denna process är minskad mängd socker i blodet samtidigt som blodtrycket och belastningen på hjärtat minskar.

Hur tar man medicinen?

Tabletten ska sväljas hel. Man kan svälja tabletten med lite vatten, med eller utan mat.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Gör uppehåll med läkemedlet

Om man blir uttorkad finns risk för allvarlig biverkan. Detta kan ske vid:

- Vätskeförlust, t.ex. vid kräkningar och diarré, hög feber mer än två dagar eller om man vistas i stark värme.
- Bristande vätskeintag.

I situationer då uttorkning kan förekomma bör du därför göra tillfälligt uppehåll med Jardiance. Du kan kontakta din sjuksköterska,

behandlade läkare eller 1177 vid tveksamheter.

Man kan behöva göra uppehåll i sin medicinering inför vissa operationer. I samband med operation får du information om hur du ska göra med Jardiance.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Läkemedel har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

De allra flesta får inga biverkningar men en del personer kan få svampinfektion i underlivet, urinvägsinfektion, klåda eller hudrodnad.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Varning!

Om du får symtom såsom andningsbesvär, förvirring, kraftig törst, kräkningar, magont, illamående, aptitlöshet och onormal trötthet eller sömnighet utan annan förklaring, - kontakta läkare omedelbart.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

Patientinformation till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare

(Läkemedlets namn är exempelvis Jardiance, Synjardy, Invokana eller Forxiga)

SGLT2-hämmare är en läkemedelsgrupp som kan användas vid behandling av typ 2-diabetes, hjärtsjukdom eller njursjukdom.

Ketoacidosis- en ovanlig men allvarlig biverkan

I sällsynta fall kan behandling med SGLT2-hämmare leda till en ansamling av syror i kroppen. Detta kan uppstå om kroppsfett bryts ned till sura ämnen, så kallade ketoner. När ketoner ansamlas i kroppen kan det leda till ketoacidosis. Detta kan ske vid normala blodsockernivåer och kan drabba alla som behandlas med en SGLT2-hämmare.

Ketoacidosis är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver akut vård på sjukhus.

Symtom på ketoacidosis:

- Illamående, kräkningar, nedsatt matlust, ont i magen
- Snabb viktnedgång
- Ökad och kraftig törst
- Sömnighet eller onormal trötthet
- Förvirring
- Snabb och djup andning
- Sötaktig andedräkt (acetondoft)

När ökar risken för ketoacidosis?

- Vid minskat kolhydratintag under exempelvis fasta (i viktreducerande syfte eller vid exempelvis Ramadan), illamående/kräkningar eller vid dieter med mycket lågt kolhydratinnehåll (exempelvis LCHF-kost).
- Vid kräkning/diarré eller hög feber som orsakat intorkning/vätskebrist.
- Vid akuta sjukdomstillstånd som kräver sjukvård.
- Vid hög alkoholkonsumtion.
- Vid svår leversjukdom.

När bör du göra tillfälligt uppehåll med SGLT2-hämmare?

- Om du planerar att fasta/ändra diet till kraftigt minskat kolhydratintag.
- Vid illamående/kräkning eller diarré och samtidigt har svårt att få i dig tillräckligt med vätska.
- Vid akut sjukdom som kräver sjukhusvård.
- Inför planerad operation i samråd med din läkare.

Meddela din mottagning om du gör uppehåll med din SGLT2-hämmare.

När ska du kontakta sjukvården?

Om du känner dig sjuk och har några av ovannämnda symtom ska du kontakta sjukvården. Informera om att du står på SGLT2-hämmare och att du önskar bli kontrollerad för ketoacidosis.

Region Jönköpings län Fakta endokrinologi (efter inspiration från Region Stockholms läkemedelskommitté samt Region Sörmlands lokala arbetsgrupp för Diabetesläkemedel).