

Adrenalin 0,1 mg/mL, KONTINUERLIG inhalation, OP/IVA, Region Jönköpings län

Gäller vid mekanisk ventilation (non invasiv eller invasiv ventilation)

Komposition för KONTINUERLIG inhalation

Adrenalin 0,1 mg/mL	10-50 mL
---------------------	----------

Beredning

1. Dra upp 10-50 mL Adrenalin 0,1 mg/mL i en spruta avsedd för kontinuerlig inhalation.

Dosering

Standarddos för **BARN** är 0,005 - 0,05 mg/kg/h

Vikt (kg)	Hastighet (mL/h) vid 0,005 mg/kg/h	Hastighet (mL/h) vid 0,05 mg/kg/h
5	0,25	2,5
10	0,50	5,0
15	0,75	7,5
20	1,0	10
30	1,5	12
40	2,0	12
50	2,5	12

Standarddos för **VUXEN** är 0,005 - 0,01 mg/kg/h

Vikt (kg)	Hastighet (mL/h) vid 0,005 mg/kg/h	Hastighet (mL/h) vid 0,01 mg/kg/h
70	3,5	7,0
80	4,0	8,0
90	4,5	9,0

Observera

Vid kontinuerlig inhalation skall filtret vid utandningsslangen bytas var 12:e timme.

Nebulisatorns kapacitet är max 12 mL/h. Ska inte inhaleras samtidigt som andra inhalationsläkemedel.

Kontrollera med jämna mellanrum att inte läkemedel kvarstannar i nebulisatornkammaren.

Vid intermitterent inhalation är doseringen en annan, se separat beredningskort.

Försiktighet vid svår hjärtsjukdom och graviditet.

Hållbarhet och förvaring

Ljuskänsligt.

Används omedelbart. Beredd lösning kan inte sparas.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT