

Antacida

(Abecol, Novalucol, Novaluzid, Refluxid, Rennie, Samarin)

Vad är antacida?

Antacida hjälper mot halsbränna, sura uppstötningar samt vid sår i mag-tarmkanalen. De verkar syrabindande eller syraneutraliserande i magsäcken. De börjar verka någon minut efter intag och effekten varar mellan 30 minuter och 2 timmar.

Antacida finns att köpa receptfritt på apotek.

Hur tar man medicinen?

Antacida finns som tuggtabletter eller pulver som löses upp i vatten. Du kan använda det när som helst under dagen, men det är fördelaktigt att ta det efter du har ätit.

Antacida kan tas vid behov alternativt som en kontinuerlig behandling vid exempelvis sår i mag-tarmkanalen.

Följ doseringsanvisningarna för ditt läkemedel och överskrid inte maxdoseringen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder andra receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

Antacida kan hos en del personer ge magsmärtor, förstoppning, diarré eller gasbildning. Många gånger minskar biverkningarna efter en tids användning av läkemedlet.

Om biverkningarna blir för besvärliga bör du kontakta din läkare.

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se och 1177.se

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.