

Temozolomid – vid hjärntumör (Tamodal, Temomedac, Temozolomid, Temozolomide)

Vad är temozolomid?

Temozolomid är ett läkemedel som används för behandling av hjärntumörer. Läkemedlet kan bromsa tillväxten och spridningen av cancer.

Hur tar man medicinen?

Temozolomid kan ges på två olika sätt; som kontinuerlig behandling under samtidig strålbehandling eller som kortare kurer utan strålbehandling. Din läkare avgör vilket sätt som är bäst för dig. Vid kontinuerlig behandling tas kapslarna varje dag under pågående strålbehandling. Oftast får du även antibiotika i förebyggande syfte. Denna avslutas ca fyra veckor efter avslutad temozolomidbehandling. Vid den kortare behandlingen tas kapslarna fem dagar i rad och sedan görs ett uppehåll i 23 dagar. Oftast behöver du då inte förebyggande antibiotikabehandling. Du ska ta kapslarna på fastande mage, antingen 1 timme före eller två timmar efter måltid. Förslagsvis tas kapslarna på kvällen. Var sedan noga med att skölja ner dem ordentligt. Kapslarna ska inte tuggas, krossas eller öppnas.

Vad är rätt dos för mig?

Din läkare bestämmer vilken dos och hur många kapslar du ska ha baserat på din längd och vikt. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Samråd med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte

kommer på det förrän det är dags för nästa dos, kontakta din mottagning.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske. Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inkl. receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av temozolomid kan du uppleva aptitlöshet, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, utslag, smakförändringar och trötthet. För att förebygga illamående rekommenderas du att ta Ondansetron ca 30-60 min före temozolomid. För att undvika förstoppning är det bra att ta Cilaxoraldroppar vid behov. Det är viktigt att du berättar för din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom temozolomid kan sätta ner ditt immunförsvar. Temozolomid kan också göra så att du lättare får blåmärken eller blödningar. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta mottagningen.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.