

Amiodaron (Cordarone)

Vad är Cordarone?

Cordarone används mot hjärtrytmrubbningar, till exempel förmaksflimmer och kammartakykardi. Medicinen hjälper hjärtat att slå i normal takt genom att minska dess elektriska retbarhet. Effekten sätter in långsamt. Maximal effekt ses vanligtvis efter några veckor.

Hur tar man medicinen?

Du bör ta tabletterna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt. Du bör ta tablettens i samband med måltid för att minska risken för magbesvär. Eventuella magbesvär minskar gradvis efter de första veckorna.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Tabletterna bör inte utsättas för direkt ljus.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra. Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Vanliga biverkningar är huvudvärk, yrsel, trötthet, sömnlöshet, metallsmak i munnen, illamående, kräkningar samt förstoppning. Läkemedlet ökar hudens känslighet för solljus vilket kan orsaka rodnad, svullnad och utslag. Solning, även i solarium, bör undvikas under behandlingen. Cordarone kan påverka sköldkörtelfunktionen, som vanligen lätt kan behandlas med läkemedel. Det kan även orsaka problem med förtjockning (fibros) av visa strukturer i lungorna. I sällsynta fall har påverkan på levern setts, vilket kan förbättras genom att minska dosen av läkemedlet. Cordarone kan ge inlagringar i ögats hornhinna. Dessa är ofarliga och försvinner då uppehåll med medicinen görs. Misstänk Cordarone vid nyttillkomna symtom och kontakta hjärtmottagningen. Cordarone försvinner långsamt ur kroppen vilket gör att både effekt och biverkningar kan kvarstå upp till flera månader efter avslutad behandling.

Kontroller

Behandlingen med Cordarone innebär regelbundna blodprovskontroller. Sköldkörtelns funktion samt leverstatus mäts. Kontrollerna syftar till att tidigt fånga upp potentiella biverkningar. Du kommer att få regelbundna kallelser för blodprovstagning. Du kommer även få kallelser för regelbundna EKG-kontroller, vanligtvis årligen.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.