

1. Vilket medel används vid desinfektion på ett rum där en patient med vinterkräksjukan (calici) vårdas?

- 1. Spordödande medel
- X. Virkon
- 2. Vanlig ytdesinfektion

2. Hur länge bedöms en patient vara smittsam efter en infektion med calici?

- 1. Tills hen får negativt provsvar
- X. 48 timmar efter sista diarré/kräkning
- 2. 24 timmar efter sista diarré/kräkning

3. Vid vilka tillfällen används munskydd och visir vid vård av patient med calici?

1. Alltid när du går in på patientrummet. Viruspartiklar kan finnas kvar i luften

X. Endast vid omhändertagande av diarréer och kräkning

2. Vid omhändertagande av diarréer och kräkning samt på patient vid transport

4. Vad är viktigast att tänka på vid utstädning av ett clostridierum?

1. Att dränka alla ytor med spordödande medel

X. Att låta rummet stå tomt en timma efter städning så att sporerna dör

2. Att mekaniskt gnugga och gno på alla ytor med spordödande medel

5. När ska man tvätta händerna med tvål och vatten inom sjukvården?

1. Om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga, och alltid vid kontakt med patient som har kräkningar och/eller diarré

X. När du inte vill sprita händerna för att du har ett sår på fingret

2. Alltid före handdesinfektion

6. Vilken är smittvägen vid calici?

1. Luftburen smitta

X. Droppsmitta och direkt eller indirekt kontaktsmitta

2. Genom huden, ha alltid handskar på dig vid kontakt med patient med calici

7. Vad innebär kohortvård?

1. Personal avdelad för att vårda enbart sjuka/smittade och de hanterar ej livsmedel
- X. Alla smittsamma patienter kan dela rum
2. Särskild personal avdelas till livsmedelshantering

8. Du har själv haft calici, men nu frisknat till. När är det ok att gå tillbaka till jobbet?

1. Efter 24 timmars symtomfrihet. Du får dock inte hantera oförpackade livsmedel förrän efter 48 timmar
- X. Efter 48 timmars symtomfrihet
2. Så fort du känner dig pigg nog att arbeta

9. Vid misstanke om calici rekommenderas provtagning. Vilket provmaterial är att föredra?

- 1. Kräkning
- X. Faeces
- 2. Sputum

10. Hur hanterar du disken från mat som varit inne hos patient med calici?

1. Placeras direkt i diskmaskin eller brickvagn
- X. Körs enskilt i diskdesinfektor
2. Engångstallrikar, bestick och mugg används

11. Du har tagit ett clostridioides-prov och har fått svaret att det är positivt för clostridioides men inga toxiner har påvisats. Vad gäller?

1. Patientens diarréer orsakas av clostridioides, följ de vårdhygieniska riktlinjerna för clostridioides

X. Det är inte clostridioides som orsakar patientens diarréer, inga skärpta vårdhygieniska riktlinjer behövs

2. Det är inte clostridioides som orsakar patientens diarréer, men följ de vårdhygieniska riktlinjerna för clostridioides