

Karbamazepin (Hermolepsin Retard, Tegretol Retard, Trimonil Retard)

Vad är Tegretol Retard?

Tegretol Retard är ett läkemedel som används mot vissa former av ansiktssmärta, så kallad trigeminusneuralgi. Trigeminusneuralgi orsakas av irritation eller skada i nervsystemet. Tegretol Retard verkar genom att minska frisättningen av ämnen som normalt förstärker nervimpulser upp till hjärnan. På så sätt dämpas attacker av kortvarig intensiv ansiktssmärta. Tegretol Retard används även för behandling av epilepsi.

Hur tar man medicinen?

Tegretol Retard är en depottablett som långsamt utsöndras i tarmen. Tegretol Retard kan tas med eller utan mat och bör sväljas hel med vatten. Om den inte kan sväljas hel går det att dela den men den får inte krossas eller tuggas. Substansen karbamazepin finns även som vanlig tablett eller som en flytande beredning. Medicindosen trappas upp och anpassas individuellt. Vanligen börjar behandlingen med 100 mg morgon och kväll och ökas enligt anvisning till symptomfrihet/biverkningsnivå. Efter några veckors besvärsfrihet provas långsam nedtrappning.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Gör det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj doserings-tillfällen som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa kapsel/tablett ska du inte ta någon extra. Du bör inte sluta ta Tegretol Retard utan att ha diskuterat detta med din läkare eller

mottagningssköterska. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis, oftast med dossänkning vart tredje dygn.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

Tegretol Retard kan orsaka yrsel, sömnhet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur denna medicinering påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter. Alkohol och grapefruktjuice kan förstärka läkemedlets biverkningar. Du avråds därför från intag under användningen av Tegretol Retard.

För att minska de vanligaste biverkningarna som muntorrhet, yrsel och trötthet startas behandlingen oftast med en låg dos som långsamt trappas upp. Under behandlingen bör du vara noggrann med din munhygien. Muntorrhet är en vanlig biverkan och ökar risken för hål i tänderna. För att minska denna risk kan du använda fluortillskott eller receptfria salivstimulerande medel. Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.