

Vaccination av patienter vid "enkla" ingrepp under anestesi

Bakgrund

Denna instruktion ska vara ett underlag för att kunna hjälpa till vid vissa enskilda vaccinationstillfällen i samband med ingrepp/ undersökning under anestesi. För att underlätta handhavandet av vaccinationen ska den anges i operationsanmälan. Vid stor kirurgi ska ansvarig operatör tillfrågas om vaccination är lämpligt.

Det är ett gemensamt ansvar att förebygga sjukdomar som är allvarliga, smittsamma och som i vissa fall kan orsaka bestående skador. Svåra sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige tack vare vaccinationer. Många aktörer bidrar till att det allmänna vaccinationsprogrammet kan upprätthållas och erbjudas till alla barn i Sverige.

De flesta vacciner är kombinationsvacciner, dvs. vacciner mot flera sjukdomar som ges i samma spruta. Den största fördelen med kombinationsvacciner är att barnet ges färre injektioner.

Förekommande vacciner

- Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib ges i en spruta.
- Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och Heb B ges i en spruta.
- Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio ges i en spruta.
- Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta ges i en spruta.
- Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund ges i en spruta.
- Vaccin mot 10 eller 13 olika pneumokocker ges i en spruta.
- Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) ges i en spruta.
- Vaccin mot säsongsinfluensa/Covid-19 ges enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet och som ges ska rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister hos Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453)

Ordinatörens ansvar inför vaccination/checklista:

- Att ”vaccinationsordinationen” är ifylld med de uppgifter som efterfrågas.
- Att vaccinationens Batchnummer och övrig information angående vaccinationen registreras enligt gällande regler efter att administrering är utförd.
- **Att vaccinet förvaras enligt gällande riktlinjer fram tills vaccinering.
*Se bilaga 1.***
- Att dokumentet ”*Kylhantering av vaccin*” medföljer vid utlämning av vaccin.
- Att inga kontraindikationer eller tidigare reaktioner förekommit.
- Att informera om eventuella biverkningar av aktuell vaccination och vid en eventuell reaktion ska vårdnadshavaren veta vart den vänder sig (till ordinatören).
- Att samtycke inhämtats från vårdnadshavare.
- Att beakta om barnet behandlas med läkemedel som försvagar immunförsvaret.
- Att beakta om barnet under fostertid/amning har exponerats för läkemedel som kan försvaga immunförsvaret. (gäller barn under 18 månader)

Vaccinatörens ansvar för vaccination/checklista:

- En vanlig förkylning är oftast inget hinder för vaccination så länge barnet är piggt och inte har feber. Har barnet feber är det bättre att vänta tills hen är frisk.
- Att dokumentera given ordination i Metavision under knappen vaccination. Följande ska anges: ordinator, läkemedlets namn, dos, administreringssätt, injektionsställe och klockslag.
- Signera på ”vaccinationsordinationen” när vaccinationen är given, datum och klockslag. Skicka därefter tillbaka ordinationen till ordinatören via posten.
- Att informera vårdnadshavaren.

Bilaga 1: Kylhantering av vaccin.

Kylhantering av vaccin

Vaccinets rätta transport- och förvaringstemperatur är +2 till +8.

Med tanke på vaccinets effekt och kvalitet är det viktigt att det förvaras och hanteras rätt under transport och lagring. De flesta vaccin har inga konserveringsmedel.

Vaccinet mister sin effekt helt eller delvis om det hanteras på fel sätt, effektförlusten är bestående.

Till vårdnadshavare:

- Planera att hämta vaccinet hos skolsköterska/BHV-sköterska/vårdcentral så nära inpå planerad operation som möjligt.
- Medtag kylväska med kylklamp till skolsköterska/BHV-sköterska/vårdcentral.
- Vaccinet ska ligga i förpackning alt. inlindat i hushållspapper i kylväskan.
- **Använd kylklamp som kylts ner i kylskåp, obs ej fryser.** (Risk att vaccinet fryser).
- Lägg vaccinet i kylskåp fram till dagen för operation.
- Operationsdagen: Lägg vaccinet i kylväska med kylklamp nedkyld i kylskåp.