

Desmopressin (Octostim) 1 mikrogram/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för injektion

Desmopressin 15 mikrogram/mL	1 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	14 mL

Beredning

1. Dra upp 14 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 20 mL-spruta.
2. Dra upp 1 mL Desmopressin 15 mikrogram/mL och tillsätt till sprutan med Natriumklorid 9 mg/mL.
3. Blanda. Koncentrationen i beredningen blir 1 mikrogram/mL.
4. Dra upp ordinerad dos i en 1 mL-spruta.

Dosering

Ges intravenöst vid diabetes insipidus: 0,25–0,5 mikrogram (= 0,25–0,5 mL).

Dosen kan upprepas.

Observera

Preparatet har en halveringstid på 11 timmar, varför försiktighet ska iakttas för att undvika oliguri/anuri på grund av överdosering.

Hållbarhet och förvaring

Obruten förpackning förvaras i kylskåp.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT