

1. Vilket medel använder vi för att torka upp diarré/kräkning vid vinterkräksjuka?

1. Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel

X. Varmt vatten och såpa eller annat rengöringsmedel

2. Virkon eller Klorin

2. Hur länge brukar en patient/vårdtagare inom sjukvården/särskilt boende bedömas som smittsam efter vinterkräksjuka?

- 1. Tills hen har negativt provsvar
- X. 48 timmar efter sista diarré/kräkning
- 2. Tills aptiten är tillbaka

3. Vid vilka tillfällen används munskydd och visir vid kontakt av vårdtagare med vinterkräksjuka?

1. Alltid när du går in på rummet. Viruspartiklar finns kvar i luften.

X. Vid omvårdnad av vårdtagare med diarréer och kräkning

2. Vid hantering av diarréer och kräkning samt på patient vid transport.

4. Vad är viktigt att tänka på när vårdtagaren varit stabilt symtomfri i 2 dagar efter clostridieinfektion?

1. Spraya alla ytor med spordödande medel

X. Låta rummet stå tomt en timma efter städning så att sporerna dör

2. Mekaniskt gnugga och gno på ytor med spordödande medel

5. När ska man tvätta händerna med tvål och vatten inom vård och omsorg?

1. Om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga, och alltid vid kontakt med vårdtagare som har kräkningar och diarré.

X. När man slutar för dagen

2. Alltid före handdesinfektion

6. Hur smittar vinterkräxsjuka?

1. Luftburen smitta

X. Droppsmitta och direkt eller indirekt kontaktsmitta

2. Genom huden, ha alltid handskar på dig vid kontakt med vårdtagare med vinterkräxsjuka

7. Vad är kohortvård?

1. Personal avdelas för att vårda enbart sjuka/smittade
- X. Personal vårdar som mest 5 vård- och omsorgstagare dagtid
2. Särskild personal avdelas till livsmedelshantering

8. Du har själv insjuknat i vinterkräksjukan, men nu frisknat till. När är det ok att gå tillbaka till jobbet?

1. Efter 24 timmars symtomfrihet. Du får dock inte hantera oförpackade livsmedel förrän efter 48 timmar
- X. Efter 48 timmars symtomfrihet
2. Så fort du känner dig pigg nog att arbeta

9. Vid misstanke om vinterkräksjuka rekommenderas provtagning (på SÄBO). Vilket provmaterial är att föredra?

1. Kräkning

X. Faeces

2. Sputum

10. Vilka rutiner gäller vid omvårdnad av vårdtagare med tarmsmitta?

1. Handtvätt med tvål och vatten. Vid behov långärmat plastförkläde, visir, munskydd och handskar.

X. Kortärmat, smyckesfritt och extra mycket handsprit vid omvårdnad

2. Isolering på eget rum. Munskydd och skoskydd när man går in på rummet