

## Mepivakain (Carbocain)-adrenalin + Natriumbikarbonat (svag blandning), BARN, Ortopedmottagningen Jönköping

Observera att det finns två spädningkort för buffrad Carbocain-adrenalin. Denna instruktion utgår från Carbocain-adrenalin **5 mg/mL**+ 5 mikrogram/mL och ger en svagare slutkoncentration av Carbocain.

### Komposition

Carbocain-adrenalin 5 mg/mL+ 5 mikrogram/mL	20 mL
Natriumbikarbonat 50 mg/mL	2,5 mL (ur en 100 mL flaska)

### Beredning

1. Dra upp 2,5 mL Natriumbikarbonat 50 mg/mL i en 5 mL spruta.
2. Tillsätt Natriumbikarbonaten i flaskan med 20 mL Carbocain-adrenalin. Koncentrationen i blandningen blir 4 mg/mL av carbocain och av adrenalin 4 mikrogram/mL.
3. Dra upp 2 mL ur blandningen till ingreppet i en 2 mL spruta.

### Dosering

Ordinerad mängd.

### Observera

Används som lokalanestesi till BARN som ska åtgärdas med akillotomomi.

### Hållbarhet och förvaring

Carbocain-adrenalin Aspen Nordic förvaras i kylskåp i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Beredningen görs omedelbart före administrering.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**