

Remifentanil (Ultiva) 50 mikrogram/mL (från 1 mg-flaska), OP Region Jönköpings län

Komposition för sprutpump

Remifentanil 1 mg (pulver)	1 x 1 mg
Natriumklorid 9 mg/mL	20 mL

Beredning

1. Använd en Remifentanil ampull 1 mg. Späd ampullen med 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en spruta med luerlockfattning vid användning av sprutpump eller vanlig spruta vid påfyllnad av tidigare infusion (av Remifentanil 5 mg).
2. Blanda noga. Koncentrationen Remifentanil i beredningen blir 50 mikrogram/mL.

Dosering

Individuell dosering. Använd sprutpump för TCI.

Observera

μ-opioid agonist med snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Administrering av remifentanil kan ge hypotension, bradykardi, muskelrigiditet och andningsdepression. Effekten av remifentanil upphör inom 10 minuter efter att infusionen avslutats. Därför skall postoperativ smärtlindring ges i samband med avslutad remifentanil-administration.

Nalaxon kan ges som specifik antidot för att häva allvarlig andningsdepression och muskelrigiditet.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Beredd lösning ska användas inom 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT