

Klassificering av parodontittpatienter – indelning i sjukdomsstadier. *World Workshop on Periodontology, Chicago, 2017/ J Clin Periodontol 2018*

Sjukdomsstadier		Stadie I	Stadie II	Stadie III	Stadie IV
Svårighetsgrad	Benförlust i röntgenbilder	Inom koronal tredjedel av rot (<15%)	Inom koronal tredjedel av rot (15% - 33%)	Överstiger koronal tredjedel av rot	
	Tandförlust	Ingen tandförlust orsakad av parodontit		Förlust av ≤4 tänder orsakad av parodontit	Förlust av ≥5 tänder orsakad av parodontit
Komplexitet		Max PPD ≤4 mm	Max PPD ≤5 mm		Utöver komplexitet för stadie III:
		Inga angulära bedefekter ≥3 mm Ingen furkationsinvolvering grad II eller III			PPD ≥6 mm Angulära bedefekter ≥3 mm Furkationsinvolvering grad II och III
Utbredning		Sjukdomens utbredning för varje stadie; lokaliserad (<30% av tänderna), generaliserad eller molar/incisiv-mönster			

Det viktigaste kliniska måttet att påvisa sjukdom i parodontala vävnader är blödning vid sonering (BoP) och gränsvärdet för att särskilja mellan individer med parodontal hälsa och patienter med gingivit är 10% BoP. Parodontal hälsa kännetecknas av soneringsdjup (PPD) ≤ 4 mm och kan påvisas vid både intakt och reducerat parodontium. För att en patient skall klassificeras som ett parodontitfall måste approximal fästeförlust påvisas vid minst 2 icke-närstående tänder.