

Uppehåll med läkemedel som påverkar koagulationen - inför operation och/eller undersökning – version Region Jönköpings län 241016/AH

Tar patienten något av följande läkemedel?

NEJ

JA

- apixaban (Eliquis)
 - edoxaban (Lixiana)
 - rivaroxaban (Xarelto)
 - dabigatran (Pradaxa)
- } DOAK
- klopidogrel
 - tinzaparin (Innohep högdos)
 - prasugrel (Efient)
 - tikagrelor (Brilique)
 - warfarin (eller marcoumar)

Har patienten haft någon av följande diagnoser senaste 3-6 mån:

- Djup ventrombos
- Lungemboli
- Stroke eller annan artäremboli
- Elkonvertering/ ablation

senaste 6-12 mån:

- Hjärtinfarkt

Övriga riskfaktorer: trombofilier, ex homocytgot APC-resistens

gäller enstaka operationer – se klinikens lista

- dipyridamol
- acetylsalicylsyra (ASA lågdos)

JA

Läkare värderar och ev remiss skrivs till läkare som ordinerat antikoagulantia/behandlar patienten

NEJ

Typ av läkemedel?

warfarin

Remiss till AK-mottagning

Kombination av flera preparat

Exempelvis

- ASA + DOAK
- 2 trombocythämmande läkemedel, t ex ASA + tikagrelor

Stöd? Se sid 2

ÖVRIGA

DOAK

Klopidogrel singelbeh, insättningsdatum > 1 år.

Singelbeh, FF och GFR > 30 mL/min

Singelbeh, FF och GFR < 30 mL/min

Om Krea-värde > 6 månader gammalt → ta nytt värde

Pausa läkemedlet 5 dagar före operation/undersökning.

Pausa läkemedlet 2 dagar före operation/undersökning.

Pausa läkemedlet 3 dagar före operation/undersökning. (Dabigatran paus 4 dagar före)


Står patienten på koagulationspåverkande läkemedel? (framgår ofta av remissen)

- Kontrollera läkemedelslistan i Cosmic
- Har recept skrivits?
- Om patienten har APO-dos → kontrollera även Pascal (se bild nedan).
- När var datum för insättning? Om insatt de senaste 1- 6 månaderna kan detta tyda på man bör granska journalen mer noggrant.

Källa	Produkt	Dosering	Status	Giltig från	Enhet	ATC-kod
NLL	Esomeprazol Krka, 20 mg, enterokapsel, hård	2 kapslar every fifth hour for 10 days	Aktiv	2025-09-18	Medicine Ward 1*	A02BC05
COSMIC	Humulin NPH KwikPen, 100 IE/ml, injektionsvätsk...	8-12 E till natten tills vidare	Aktuell	2025-06-11	Eksjö VC Bra Liv	A10AC01
NLL	Kalcipos®-D, 500 mg/400 IE, filmdragerad... [Disp]	1 tablett kl 20.	Aktiv	2025-10-27	Sjukhuset i Blekinge	
COSMIC	Innohep, 10 000 anti-Xa IE, injektionsvätska, lösn...	1 förfylld spruta 1 gång per dag tills vidare	Aktuell	2025-06-12	Eksjö VC Bra Liv	B01AB10
NLL	Innohep®, 10 000 anti-Xa IE, inj-vätska, lösning, fö...	1 förfylld spruta 1 gång per dag tills vidare	Aktiv	2025-11-04	Habo VC DLM	B01AB10

Vilka diagnoser har patienten?

- Titta på diagnosöversikten på patientöversikten i Cosmic. Sortera med fördel på de senaste diagnoserna (se bild nedan).



- Om elkonvertering finns bland diagnoser – se Journalia AVK (där syns alltid patienter som är aktuella för elkonvertering/ablationer). Det är viktigt att behålla DOAK (eller ge innohep) 1-3 månader vid elkonvertering/ablation
- Övrig riskfaktor: trombofilier, ex homocytot APC-resistens (se uppmärksamhetssymbolen i Cosmic)

Stödfunktioner

- AK-sjuksköterska stödjer/ger råd vid oklara situationer. Stöd kan fås via telefon, remiss eller messenger i Cosmic (AK mott Eks Funktionsbrevlåda, Med mott AK jkp Funktionsbrevlåda eller Medicinmott VMO Funktionsbrevlåda)
- För OP-planerande sjuksköterskor/andra med den rollen finns en rapport i Diver framtagen vars syfte är att underlätta att riskpatienter för blödning/tromboembolisk sjukdom hittas.
- Apotekare kan stödja vid lång läkemedelslista /oklar medicinering genom att stämma av med patient/närstående/kommunsjuksköterska samt uppdatera Cosmic-listan: Skriv till funktionsbrevlåda i Messenger Apotekare-läkemedel inför OP Funktionsbrevlåda (ny från 240923). Mer information: Kontakta apotekare Anne Hiselius 0703-60 04 91, anne.hiselius@rjl.se

Återinsättning

Dagkirurgi: Läkemedlen återinsätts dagen efter undersökning/operation eller i enlighet med individuell anvisning från operatör/skopist.