

Patientinformation om läkemedlet

# Diklofenak suppositorium

(Diklofenak, Voltaren)

## Vad är diklofenak?

Diklofenak används för att lindra mild till måttlig smärta och inflammation. Diklofenak verkar genom att minska kroppens bildning av ämnen som framkallar smärta och inflammation. Dessutom sänker diklofenak feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

## Hur tar man läkemedlet?

Suppositoriet ska föras in i ändtarmen. Det går lättast att föra in det i ändtarmen om du sitter på huk, sitter böjd på en toalettstol eller ligger på sidan. För in suppositoriet cirka 5 cm eller halva fingrets längd med den platta änden först. Införandet kan underlättas om suppositoriet hastigt doppas i ljummet vatten omedelbart före användandet.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen. Diklofenak kan tas regelbundet eller vid behov. Om du ska ta diklofenak regelbundet ska de tas vid samma tider varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Om du har fått diklofenak vid tillfällig smärta så ska du minska dosen när smärtan minskar. Om du har fått läkemedel med paracetamol, exempelvis Alvedon eller Panodil, tillsammans med diklofenak, så bör du minska dosen diklofenak innan du minskar dosen paracetamol. Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa doseringstillfälle ska du inte ta någon extra.

## Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

## Biverkningar

Läkemedel har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder diklofenak kan få magbesvär som t.ex illamående, ont i magen eller diarré. Läkemedlet kan öka risken för magsår och ge yrsel, huvudvärk eller hudutslag. Risken för biverkningar ökar vid höga doser, långa behandlingstider och med åldern.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

## Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på [fass.se](http://fass.se) eller [1177.se](http://1177.se).

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.