

Klinik

Patientidentitet

Nervblockad med kvarliggande kateter – vuxna/barn Ordinationsblad

Anläggande: datum kl Sida: Hö Vä

Typ av blockad:

- Interscalen plexus
- Infraclaviculär plexus
- Annan regional blockad
övre extremiteten:
- Femoralisblockad (3:1)
- Ischiadicus
- Annan regional blockad
nedre extremiteten:

Kommentar:

Tröskelvärde:.....mA

Ultraljudsledd ja nej

Markering vid hudnivå:.....cm

Övrigt:.....

Katetern är märkt:

Blockadkateter

Första dos : Narop 2 mg/mlml Narop 7,5 mg/mlml

Given kl..... Ej given, skall ges: när spinalbedövningen har släppt

Följande dos kan ges tidigast kl.....

Följande doser: Narop 2 mg/ml, 20 ml var fjärde timme (efter interscalen/
infraclaviculär/ischiadicus ges dosen när bedövningen börjar släppa, men senast efter 8 tim)

Annan regim:.....

Anvisningar för dosjustering: Om ej annan regim angivits kan dosjustering göras av ansvarig sjuksköterska enligt nedan. Dosjustering görs efter NRS skattning och bedömning av motorisk påverkan. Dålig effekt bör leda till högre dos och genombrottssmärta till tätare intervall. Känselbortfall och svaghet kan normalt förekomma, om patienten upplever detta besvärande bör dosen reduceras.

Dosen kan justeras inom ramen:

10 – 40 ml Narop 2 mg/ml.

Doseringsintervall:

2 – 4 timmar.

Maxdos Narop är 800 mg/dygn för vuxna. Barn, enligt individuell ordination.

Skötsel: Omläggning behövs ej under behandlingen.

Avslutning: Efter behandlingstidens slut, normalt 2-3-5 dygn, dras katetern av sjuksköterska.

Ansvarig narkosläkare: