

KLL Obinutuzumab- Venetoklax Kur 3-7, 28 d

Kurintervall 28 dagar

Indikation: KLL

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm.	Dag
A	Obinutuzumab	1000 mg (fast dos)	1	1	i.v.	1
B	Venetoklax	400 mg (fast dos)	1	28	p.o.	1-28

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Ny cykel/kur dag 29
A Obinutuzumab	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B Venetoklax	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Övrigt

- 6 kurer totalt ges med kombinationen Obinutuzumab-Venetoklax. Därefter ges 6 kurer med Venetoklax som monoterapi.
- Allvarliga infusion relaterade biverkningar kan förekomma i samband med den första dosen, vilket föranleder noggrann övervakning.
- Kontroll av blod- och elektrolytstatus (kalium, urinsyra, fosfor, kalcium) och kreatinin
- Behandling med Venetoklax innebär en hög risk för tumörlys, Fasturtec ska övervägas initialt. Allopurinol 300 mgx1 bör ges under upptrappningsfasen med start minst två dygn före insättning av Venetoklax. Riklig hydrering samt monitorering av tumörlysprover vid insättning samt upptrappning.
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- [Obinutuzumab – Venetoklax kur 3-7 kunskapsbanken RCC](#)

Patientinformation

- [Patientinformation från kunskapsbanken RCC](#)
- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Länssjukhuset Ryhov akut?](#)
- [Akut, när söka hematologiska sektionen, Eksjö, akut?](#)
- [Akut, när söka hematologiska sektionen Värnamo, akut?](#)

Dosreduktion

- Avbryt behandlingen med Venetoklax vid icke-hematologisk tox. grad 3 eller 4, neutropeni grad 3 eller 4 med infektion eller feber, eller vid hematologisk tox. grad 4, förutom lymfopeni. vid återgång till grad 1 eller ursprungsnivå kan behandlingen återupptas med samma dos. Om tox. återkommer se FASS för dosminskning.

Körschema DAG 1

Dag	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	1 Ge eller kontrollera att patienten tagit <ul style="list-style-type: none"> T. Paracetamol 1 g 30-60 minuter före start (Desloratadin och betametason endast om patienten reagerat dag 1-2, eller vid ordination) 		Cytodos
	2 Sätt spoldropp Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml		-
	3 Blodtryckskontroll, före behandlingsstart och därefter enligt schema för Gazyvaro		-
	4 Ha akutvagn/akutlåda tillgängligt		-
	5 Starta Obinutuzumab droppet och spola snabbt in max 20 ml , detta för att tömma aggregatet på koksalt och fylla det med verksamt substans. Stoppa sedan droppet.		
	6 Ge Obinutuzumab spädd i Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml som intravenös infusion. Om ingen reaktion på föregående infusion, ge 100 mg/timme. Infusionshastigheten kan trappas upp i steg om 100 mg/timme var 30 minut till max 400 mg/timme. Upptäppning se separat schema.	ca 3,5 timmar	Cytodos
	7 Kontrollera att patienten har tillgång till Venetoklax. Ska tas i samband med måltid. Om en dos misstas ska den endast tas om det är 8 timmar kvar till nästa planerade dos. Grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) ska undvikas.		Cytodos