

Zoledronsyra vid lungcancer (palliativ)

Zoledronsyra (Zometa) är ett läkemedel med skelettstärkande effekt. Läkemedlet kan förhindra risken för frakturer vid skelettmetastasering.

Zoledronsyra ges som intravenös infusion under cirka 20 minuter.

Behandlingen ges i kombination med kalk- och D-vitamintillskott i form av daglig tablettbehandling. Provtagning för kontroll av njurfunktion och kalkvärden görs före varje behandling.

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder zoledronsyra kan uppleva övergående feberstegring och muskel- och ledsmärtor den första infusionen. Dessa biverkningar är mycket sällsynta i samband med de senare behandlinggångerna

I sällsynta fall finns risk för skador på käkbenet. Zoledronsyra kan också orsaka försämrad läkning om en tand behöver tas bort i framtiden. Då effekten av Zoledronsyra kvarstår efter utsättning är det därför viktigt att du alltid berättar för din tandläkare och tandhygienist att du behandlas eller har behandlats med Zoledronsyra. Munhygien är mycket viktigt för att förebygga tandproblem. Följ de råd du får av din tandläkare/tandhygienist.

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer i Patient-FASS.

Vid frågor kontakta din kontaktsjuksköterska