

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av ungdomar

Ibland ger tandläkaren en lugnande medicin före tandbehandlingen. Det är för att du inte ska känna ängslan eller oro vid tandbehandlingen. Medicinen hjälper dig också att glömma om behandlingen har varit obehaglig. Medicinen ges i form av tabletter eller mixtur (flytande).

Viktigt att tänka på inför behandling med lugnande medicin

- Du ska inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än 4 timmar före tandbehandlingen.
- Det går bra att dricka vatten eller saft - det vill säga klar dryck - fram till 1 timma innan tandbehandlingen. Drick inte juice.
- Senare än 1 timma före tandbehandlingen får du inte dricka någonting alls.
- Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken.

Så fungerar den lugnande medicinen

- Den har en avslappnande och lugnande effekt.
- Den verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen.
- Den kan påverka förmågan att komma ihåg.

Tänk på detta efter behandlingen

Efter avslutad tandbehandling får du stanna kvar på kliniken minst 1 timme från det att du tog medicinen. Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken. Du får inte köra moped eller bil förrän efter 24 timmar.