

## Goserelin (Zoladex)

### Vad är Zoladex?

Efter din bröstoperation undersöktes tumören avseende förekomst av östrogenreceptorer, dvs om tumören är hormonkänslig eller ej. Provet visade att tumören var känslig för hormoner och därför rekommenderar din läkare att du behandlas med antiöstrogen.

Hos kvinnor före övergångsåldern bildas östrogen framför allt av äggstockarna. Zoladex stänger av äggstockarnas funktion och därmed kan de inte producera östrogen. Resultatet blir att kvinnan hamnar i ett tidigt klimakterium och att tumören inte kan tillväxtstimuleras av höga östrogennivåer. Med kombination av Zoladex, kan man troligtvis ytterligare minska risken för återfall hos kvinnor som inte kommit till övergångsåldern.

### Hur tar man medicinen?

Zoladex ges i form av en injektion med ett litet implantat som placeras under huden i buk fettet. Behandling ges av sjuksköterska var 28:e dag i 5 år.

### Biverkningar

Zoladex kan ge symtom som liknar övergångsbesvär, exempelvis värmevallningar, svettningar, humörpåverkan, nedstämdhet, lindriga hudutslag samt skelettsmärta.

Har du kvar dina menstruationer kommer dessa att upphöra. Torrhet i underlivets slemhinnor kan också uppstå liksom minskad sexlust.

### Rådfråga din kontaktsjuksköterska eller läkare om

- du använder p-piller eller annan hormonell behandling.
- du planerar graviditet.

Mediciner påverkas oss i olika utsträckning. De flesta patienter tolererar behandling väl och många biverkningar kan minska efter en tids användning.

Skulle du ha frågor eller andra problem i samband med din medicinering kontakta din kontaktsjuksköterska eller läkare.

### Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på [fass.se](http://fass.se) eller [1177.se](http://1177.se).

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.