

## Metylprednisolon (Solu-Medrol) 1 g, Reumatologi, Medicinkliniken Jönköping

### Komposition för infusion

Solu-Medrol	1 g
Sterilt vatten för injektion (medföljer)	15,6 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	100 mL

### Beredning

1. Dra upp sterilt vatten (medföljer förpackningen) i en 20 mL-spruta och tillsätt flaska med torrs substans Solu-Medrol
2. Roter flaskan försiktigt och låt sedan stå en stund. Koncentrationen i stamlösningen blir 62,5 mg/mL. Grumlösning ska inte användas.
3. Tillsätt 1 g Solu-Medrol stamlösning till en 100 mL infusionspåse med Natriumklorid 9 mg/mL.

### Dosering

Ges som kontinuerlig infusion under 1-2 timmar. Infusionshastighet är individuell, beroende på hur patienten tål infusionen.

### Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: 3 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kylskåp.

### Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterska och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**