

CNS Lomustin 42 d

Cytodose: "CNS- Lomustin 42 d" Kurintervall 42 dagar

Indikation: Maligna gliom

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Lomustin (CCNU)	100-130*	1	1	p.o	1

* avrundas till lämpligt antal kapslar. Varje kapsel är på 40 mg.

	Substans/dag	1	Uppehåll dag 2-42	Dag 43 ny cykel
A	Lomustin	A	-	

Övrigt

- Ackumulerad maxdos 1000 mg/m² (p.g.a risk för lungfibros). Observera att eventuell tidigare behandling med Karmustin ska räknas in i den kumulativa dosen.
- [Provtagnin](#)g Benmärgstox kommer sent: TPK-sänkning efter ca 4 v, LPK-sänkning efter ca 5-6 v.

Dosreduktion

Substans	Neutrofila <1,5	TPK < 100
Lomustin	Behandlingen uppskjutes (samt överväg dosreduktion med 25 % för nästa kur eller förlängning av kurlängd till 56 dagar)	Behandlingen uppskjutes (samt överväg dosreduktion med 25 % för nästa kur eller förlängning av kurlängd till 56 dagar)

[Patientinformation](#)

[Antiemetikaschema högemetogen](#)

Körschema

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
<p>Skriv ut medicinlista från ELAS och skicka med patienten samt kapsel Lomustin.</p> <p>Informera patienten om att ta antiemetika ca 1 timme före intag av Lomustin.</p> <p>Lomustin ska tas på kvällen efter 3 timmars fasta och undvika att äta inom 1 timme efter tablettintag. Ska sväljas hela med vatten. Vid kräkning ska patienten kontakta kliniken för rådgivning om ny dos ska tas eller inte.</p>		Cytodose

