

## Inför bortkoppling av homepump/cytostatikapump i hemmet

Om intresse finns och sjuksköterska anser att patient alternativt närstående kan klara av bortkoppling i hemmet behöver man säkerställa att patient och/eller närstående instrueras om tillvägagångssätt på ett säkert sätt.

Patient och/eller närstående ska första gången koppla bort homepump under övervakning av sjuksköterska.

### Egenvårdsintyg fylls i Cosmic:

Hittas via: Journal -> Ny blankett -> Övriga -> Bedömning av egenvård

- **Åtgärd som ska utföras:** *Bortkoppling av cytostatikapump och spolning och dragnig av venportsnål.*
- **Vem ska utföra åtgärden.** *Patient eller närstående*
- **Hur och vem instruerar den som ska utföra egenvården?** *Utbildningstillfälle på dagvården och skriftlig instruktion av (namn och yrke).*
- **Vem i hälso- och sjukvården ska kontaktas vid försämrad situation/oförutsedda händelser?** *Onkologens dagvård 010-242 29 19, alternativt Jourtid: Onkologens vårdavdelning 010-242 29 25. Vid mycket allvarlig situation 112.*
- **Ovanstående har gjorts i samråd med patienten?** Kryssa
- **Bedömningsperioden avser tidsperiod:** *max 6 månaders period sedan bör ny bedömning göras.*

### Ett startpaket skickas med patienten hem med:

- Handsprit
- Kompresser
- Klorhexidinsprit
- [Skriftlig patientinformation](#)

### Skicka med patienten inför varje bortkoppling:

- Handskar (2 par)
- Avfallspåse
- Plåster
- Underlägg
- Förfyllda sprutor med natriumklorid 4 st