

Läpp-käk-gomspalt barn, ur öronsynpunkt, vårdriktlinje öron-, näs- och halskliniken RJL

Samtliga barn med läpp-käk-gomspalt, så kallade LKG-barn, i Sydöstra sjukvårdsregionen behandlas via LKG-teamet på Universitetssjukhuset i Linköping. Detta team innefattar plastikkirurg, foniater, käkortoped, logoped, tandsköterska, ortodontisassistent och barnsköterska.

Logopedisk uppföljning och träning ska ske vid behov på hemsjukhuset mellan kontrollerna i Linköping.

Barn med gomspalt har så gott som alltid serös mediaotit och behöver därför långvarig plaströrsbehandling. Vanligen sätts plaströren på US i Linköping i samband med läpp-plastiken vid 3-4 månaders ålder.

Har barnet inte läppspalt och alltså inte kommer opereras förrän vid 12-15 månaders ålder då man sluter gommen, kan man sätta plaströr tidigare på hemortskliniken. Rören ska kontrolleras var sjätte månad, eftersom utstötta plaströr och serös mediaotit behöver upptäckas för att kunna optimera hörsel och talutvecklingen.

Patienten har ett speciellt kort som tas med och ifylles vid varje kontroll angående öronstatus.

Kontroller i Linköping följer ett schema med vissa individuella variationer + ev. postoperativa kontroller

Nyfödd	Läppen tejpas, barnet får näskrok vid behov
3-4 månader	Läppplastik + plaströrsinsättning
12-15 månader	Gomslutning
18 månader	Postoperativ kontroll efter gomslutning. Teambedömning
3 år	Teambedömning
5 år	Teambedömning
4-6 år	Velofarynxlambåoperation vid behov
7-10 år	Käkspalt opereras, obturator vid behov
10, 13 år	Teambedömning
16 år	Plastikkirurgisk rekonstruktion av näsa, läpp
19-20 år	Käkkirurgisk bedömning, avslutning