

Bröst Ribociklib (Kisqali) 28 d

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: ER+/HER2- metastaserad samt adjuvant bröstcancer.

Vid behandling av premenopausala kvinnor ges samtidig behandling med GnRH-analog.

Behandling

| Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser kur | Adm | Dag |
|---------------------|--|---------------------------------------|-----------|------|------|
| A Ribociklib | 1-3 tabletter á 200 mg intas samtidigt | 1 | 28 | p.o. | 1-21 |

| Substans/dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Paus dag 22-28 | Dag 29 ny cykel/kur | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|---------------------|--|
| A Ribociklib | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | |

Övrigt

- Vid adjuvant intention är dosen 400 mg/dag i 3 år.
- [Riktlinjer för ribociclib och palbociclib biverkningar](#)
- EKG kur 1 dag 1 och 14 (QT- tid) QT. EKGt ska vara "godkänt" av onkologläkare innan nästa kur påbörjas
- Formel för beräkning av QT- tid (använd Fridericia, QTcF):
<https://www.mdcalc.com/corrected-qt-interval-qt-c>
- Provtagning: se ovan under riktlinjer (PPT-fil)
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Doseringsguide fass](#)
[Doseringsguide företaget](#)

Dosreduktion

| Rekommenderad dos palliativ intention | 1:a gången | 2:a gången | 3:e gången |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 600 mg/dag | 400 mg/dag | 200 mg/ dag | Avsluta behandlingen |
| Rekommenderad dos adjuvant intention | 1:a gången | 2:a gången | 3:e gången |
| 400 mg/dag | 200 mg/dag | - | - |

[Patientinformation](#)

Körschema Ribociklib (Kisqali) dag 1-21

| | |
|---|--|
| 1 | Patienten får recept med två uttag första gången |
|---|--|

Anmärkningar

- EKG tas via vårdcentralen (remiss i cosmic)
- För adjuvant behandling, se rutinbeskrivning på intranätet ([Rutiner adjuvant CDK4/6 \(Abemaciclib och Ribociclib\)-Regionens intranät](#))
- Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan föda vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Vid missad dos eller vid kräkning ska ingen ny dos tas samma dag. Ta nästa dos vid vanlig tid.
- Grapefrukt, grapefruktjuice ska undvikas då detta kan öka biverkningarna. Även johannesört bör undvikas då det påverkar effekten av läkemedlet. Spår av jordnötter och soja kan förekomma (kontraindicerat till allergiker).
- Uppmana patienten att hämta ut recept på Ryhov (63 st. förpackning ska finnas i lager)