

Betametason (Betametason, Betapred)

Vad är Betapred?

Betapred används som behandling vid många olika sjukdomar och tillstånd. Läkemedlet hör till gruppen glukokortikoider och har en kraftigt inflammationsdämpande verkan. Betapred har god smärtstillande effekt och minskar även illamående och ger ett ökat välbefinnande med bättre aptit och humör.

Hur tar man medicinen?

Tablett Betapred 0,5 mg tas vanligen enligt ett schema under 20 dagar. Den kan även tas enligt annan dosering ordinerad av läkare.

Tabletterna bör lösas upp i ett par matskedar vatten eller saft. Det tar en till två minuter innan tabletterna är helt upplösta. Tabletterna kan även tuggas sönder väl. Skölj gärna munnen med vatten efter intagen dos, för att minska risken för att få svamp i munhålan.

Om du inte känner av någon positiv effekt efter 7 dagar kan du sluta med medicinen och kontakta din läkare.

Betapred tabletter är känsliga för fukt och ljus. Därför ska tabletterna förvaras i originalförpackningen tills de ska användas.

Om du vid något tillfälle mår illa och kräks under Betapred-kuren ska du kontakta den läkare som ordinerat Betapred. Du kan då få ett recept på Betapred injektion som kan ges subkutant eller intravenöst i samma dos.

Exempelvis 8 tabletter Betapred =
1 ml Betapred 4 mg/ml injektionsvätska.

Om det är aktuellt kan du få hjälp att administrera dosen av en sjuksköterska

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Betapred har i första hand positiva effekter men kan ibland även ge biverkningar. Urkalkning av skelett, magsårsrisk och viktuppgång är några exempel men dessa ses vanligen efter lång tids användning.

Kontakta din läkare om du får ont i magen, särskilt om du använder läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (tex Magnecyl eller Treo) eller antiinflammatoriska läkemedel (tex Ipren, Diklofenak).

Betapred kan göra att man blir överaktiv och får svårt att sova, därför ska medicinen tas på morgonen.

Om du har diabetes kan blodsockernivåerna påverkas av att du tar Betapred. Därför är det bra att göra tätare kontroller av blodsockret under tiden som du använder Betapred.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

KORTISONSCHEMA - BETAPRED
 (innehåller betametason)

Schema för dosering av tablett eller injektion Betapred (betametason) under 20 dagar.

- Tablett Betapred 0,5 mg (upplöses i ett par matskedar vatten)
- Injektion Betapred 4 mg/ml (kan ges subkutant eller intravenöst)

Dosen administreras på morgonen.

Dag	Datum	Dygnsdos	Antal tabletter	Mängd injektionsvätska
				Subkutant Intravenöst
1		5,0 mg	10 stycken	1,3 ml
2		5,0 mg	10 stycken	1,3 ml
3		4,5 mg	9 stycken	1,1 ml
4		4,5 mg	9 stycken	1,1 ml
5		4,0 mg	8 stycken	1,0 ml
6		4,0 mg	8 stycken	1,0 ml
7		3,5 mg	7 stycken	0,9 ml
8		3,5 mg	7 stycken	0,9 ml
9		3,0 mg	6 stycken	0,8 ml
10		3,0 mg	6 stycken	0,8 ml
11		2,5 mg	5 stycken	0,6 ml
12		2,5 mg	5 stycken	0,6 ml
13		2,0 mg	4 stycken	0,5 ml
14		2,0 mg	4 stycken	0,5 ml
15		1,5 mg	3 stycken	0,4 ml
16		1,5 mg	3 stycken	0,4 ml
17		1,0 mg	2 stycken	0,3 ml
18		1,0 mg	2 stycken	0,3 ml
19		0,5 mg	1 stycken	0,1 ml
20		0,5 mg	1 stycken	0,1 ml