

Galaktografi

Allmänt

En förutsättning för att göra undersökningen är en fortsatt sekretion (vätska och blod) från bröstet, annars kan den rätta mjölkgången inte identifieras för att kunna utföra undersökningen.

Kontraindikationer

Kontraindikationer mot jodkontrastmedel.

Förberedelser

Inför undersökningen ska bröstet värmas och bröstvårtan bedövas med Xylocain gel. Detta görs på mammografiavdelningen av en röntgensjuksköterska.

Hur går en undersökning till

Galaktografi är en undersökning av bröstets mjölkgångar.

Undersökningen utförs av en mammografiradiolog. Patienten sitter på en stol eller ligger på en brits. Kontrastmedel sprutas in i den aktuella bröstgången via gångöppningen i bröstvårtan med en speciell trubbig nål. Bröstgången fylls med kontrastmedel varpå vanlig bildtagning sker som för en vanlig mammografiundersökning.

Kontrastmedlet försvinner från mjölkgångarna av sig själv.

Hela undersökningen tar mellan 30–60 minuter.

Remiss

Remittenten skrivs remiss i BOS under beställning radiologi – välj utförande enhet Mammografi Ryhov. Välj Galaktografi.

För mammografi enligt SVF se länken: Bröstcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Eftervård

Ingen eftervård.