

CUP Paclitaxel - Karboplatin

Cytodose= "CUP Pacli200-KarboAUC6 21d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: CUP - okänd primärtumör

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Paclitaxel (Taxol)	200 mg/m ²	1	1	i.v	1
B	Karboplatin(Paraplatin)	AUC=6*	1	1	i.v.	1

**Calverts formel Dos (mg) = (planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Paclitaxel	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Karboplatin	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Övrigt

- [Antiemetika högemetogen](#)
- Iohexolclearance. Använd det okorrigerade värdet för dosberäkning av karboplatin
- Allergiprofylax Paclitaxel, minskas normalt ej
- [Provtagning](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75% av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50% av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK

	< 1,5	<100
Paclitaxel, karboplatin	Behandlingen uppskjutes i en vecka.	Behandlingen uppskjutes i en vecka.

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion

Iohexolclearance upprepas om s-kreatinin stiger > 120% av övre normalgränsen för patienten eller ökar med mer än 30 %.

Patientinformation

- [Patientinformation Karboplatin-Paclitaxel](#) (obs lunga)
- [Högemetogen + allergi](#)

- **Körschema**

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax Ge T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 timme innan paclitaxel Ge T. Betapred 8 mg 1 timme innan paclitaxel Kontrollera att patienten har tagit antiemetika (betapred ingår i allergiprofylaxen så ge ej dubbel dos) Kontrollera blodtryck och övervaka patienten 15 minuter de två första Paclitaxelbehandlingarna		Cytodose
Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Paclitaxel spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	3 timmar	Cytodose
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	1 timme	Cytodose