

## Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Det är alltid behandlande läkare som ger information och utfärdar föreskrifter. Personer med aktuella tarmsymtom – kräkningar och/eller diarré – skall inte arbeta i vård med patientkontakt eller med livsmedel eller vistas i barnomsorg oavsett vad som påvisas i fecesanalyser.

För följande riskgrupper krävs kontrollprover före återgång i verksamhet:

- Personer som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel
- Vårdpersonal som vårdar spädbarn eller personer med gravt nedsatt immunförsvar
- Förskolebarn

Salmonella	1 negativt prov  Undantag: förskolebarn behöver inte lämna kontrollprov, utan kan återgå vid symptomfrihet.
Salmonella typhi/paratyphi	3 negativa prov
Shigella	Antibiotikabehandlad: 1 negativt prov  Ej antibiotikabehandlad: 3 negativa prov
EHEC	1 negativt prov

Efter antibiotikabehandling bör inte kontrollprov tas tidigare än en vecka efter avslutad behandling.

Vid långvarigt bärarskap av EHEC hos stabilt symptomfri individ, kan avstängning omprövas i samråd med smittskyddsläkaren.

För andra smittämnen, t.ex Campylobacter, Yersinia, Entamoeba histolytica, Giardia och Cryptosporidier, krävs inga kontrollprover utan återgång i verksamhet kan ske vid symptomfrihet.

Personer som arbetar med oförpackade livsmedel är enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela sin arbetsledare om eventuell smitta. Vissa arbetsplatser har inom ramen för livsmedelslagen särskilda riktlinjer för när återgång i arbete kan ske.