

Städning efter kräkning – diskussionsfrågor och vägledande svar

Förklara att ni ska titta på en docka som kräks och som visar hur långt en kräkning kan spridas i verkligheten. Spola fram klippet till 1.08 minuter och visa därifrån. Dokumentet innehåller separata svar för kommun och region, se nedan.

Diskussionsfrågor:

1. Hur hanterar ni kräkningar på er enhet?
2. Vid en liknande kräkning som på videon, ska 8 kvadratmeter städas runt kräkningen. Vad skulle kunna försvåra städning på omkringliggande ytor på er enhet?
3. Kan ni komma på något ni kan göra annorlunda för att förhindra smittspridning på er enhet?

Kommunal vård och omsorg

Svar fråga 2

Exempelvis:

- Att det är mycket saker framplockat på toaletten som måste rengöras.
- Att det är mycket engångsmaterial framme på närliggande ytor, så som handskförpackning, omlägningsmaterial, blöjor och tvättlappar. Dessa produkter kan ha blivit kontaminerade om en vårdtagare har kräcks i närheten.
- Att det finns brist på kunskap hos personalen om hur rengöring/desinfektion går till och vilket medel som ska användas när.
- Att det är brist på lättillgängligt rengöring/desinfektionsmedel. Det är bra om det finns ytdesinfektionsmedel lättillgängligt och att personalen vet var desinfektionsmedel för vissa smittor finns.
- Om möbler inte har avtagbar klädsel som går att tvätta.
- Att möbler inte är avtorkningsbara (ex. textilbeklädda stolar).

Svar fråga 3

Exempelvis:

- Håll ytor fria från saker. Ha så lite engångsmaterial framme som möjligt, förvara helst i skåp eller lådor. Ha lite saker framplockat på toaletten.
- Ha en tvättsäck på rummet, lägg smutsig tvätt direkt i tvättsäcken. Lägg inte smutsig tvätt på ytor som handfat med mera under vårdmomentet.
- Var medveten om att en kräkning kan skvätta långt, ni kan behöva städa på många ställen så som gardiner, mattor, möbler och soffor.
- Kolla att ytdesinfektion finns på alla platser där det behövs.
- Se till att personal har kännedom om var övriga desinfektionsmedel finns och kontrollera hållbarhet på blandade kemikalier, exempelvis Virkon.

- Var alltid noggranna med att desinfektera utrustning efter användning om utrustningen inte är patientbunden för att förhindra smittspridning mellan patienter.
- Se till att städutrustningen görs rent efter användning.
- Tvätta alltid händerna med tvål och vatten, torka dem torra och sprita dem efter arbete hos vårdtagare som har kräkts eller har diarré.
- Sprita händerna innan och efter användning av handskar

Regional vård

Svar fråga 2

Exempelvis:

- Ytor (som rullande vagnar, bänkytor) med mycket saker på gör det svårt att städa.
- Att det finns mycket framplockat engångsmaterial (handskförpackning, omläggingsmaterial, blöjor, provtagningsmaterial). Engångsmaterial som kontaminerats måste slängas eftersom det inte går att desinfektera det.
- Flergångsprodukter, t.ex. höggradigt rena instrument, som ligger framme måste desinfekteras igen enligt rutin.
- Medicinteknisk utrustning (blodtrycksmanschett, saturationsmätare) som förvaras på omkringliggande ytor måste desinfekteras innan användning på annan patient.
- Att det finns brist på kunskap hos personalen om hur desinfektion går till och vilket desinfektionsmedel som ska användas när.
- Att det är brist på lättillgängligt desinfektionsmedel. Det är bra om det finns ytdesinfektionsmedel lättillgängligt och att personalen vet var Virkon och Incidin finns.

Svar fråga 3

Exempelvis:

- Håll ytor fria från saker. Ha så lite engångsmaterial framme som möjligt, förvara helst i skåp eller lådor. Ha lite saker framplockat på toaletten.
- Ha en tvättsäck på rummet, lägg smutsig tvätt direkt i tvättsäcken. Lägg inte smutsig tvätt på ytor som handfat, stolar eller liknande under vårdmomentet.
- Var medveten om att en kräkning kan skvätta långt, ni kan behöva städa på många ställen.
- Kolla att ytdesinfektion finns på alla platser där det behövs.
- Se till att personal har kännedom om var övriga desinfektionsmedel finns och kontrollera hållbarhet på blandade kemikalier, exempelvis Virkon.
- Var alltid noggranna med att desinfektera utrustning som används till flera patienter direkt efter användning för att förhindra smittspridning mellan patienter.
- Se till att städutrustningen görs rent efter användning.
- Tvätta alltid händerna med tvål och vatten, torka dem torra och sprita dem efter arbete hos vårdtagare som kräkts eller har diarré.
- Sprita händerna innan och efter användning av handskar